

JOURNÉE MONDIALE



Visuel réalisé par l'IFSI du CHR de Mercy - Promotion 2012-2015

Mercredi 2 décembre 2015 de 9h30 à 17h00
Centre Médical et Dentaire MGEN - 6 rue Désilles à Nancy
Espace ludique d'information - Documentation - Préservatifs
Dépistage rapide du VIH proposé.

Le SIDA

Syndrome d'Immuno Déficience Acquis.

Est dû à un virus : le **VIH** : **V**irus de l'**I**mmunodéficience **H**umaine.

La maladie SIDA est l'étape la plus avancée et la plus grave d'une infection par le VIH.

Le VIH est véhiculé par les sécrétions sexuelles, le sang et le lait maternel. Une fois dans l'organisme, le VIH attaque principalement certains globules blancs (les lymphocytes T4) qui ont pour fonction de nous défendre contre les maladies.

3 modes de transmission

- Rapport sexuel non protégé.
- Partage de matériel de consommation de drogues ou accident d'exposition au sang.
- Transmission de la mère à l'enfant (grossesse, accouchement, allaitement).

Aucun risque de transmission dans les situations suivantes :

- Le baiser, les caresses.
- Le contact cutané avec la cuvette des WC.
- Le don de sang.
- Les piqûres d'insectes.
- Les piercing, les tatouages, il n'y a pas de risque si le matériel utilisé est à usage unique.

La prévention

Le préservatif :

Les préservatifs masculins et féminins sont les moyens les plus efficaces de prévention de la transmission du VIH et des Infections Sexuellement Transmissibles (IST), et sont également des moyens de contraception.

On le trouve dans les pharmacies, dans les supermarchés, dans les distributeurs, dans les bureaux de tabac, dans certaines associations et infirmeries scolaires.

Le stéribox[®] :

Il contient 2 seringues, le matériel d'injection stérile et 1 préservatif.

Usage personnel-vente libre en pharmacie et gratuit dans certaines associations.

Le test de dépistage du SIDA

Quand ?

Pour savoir si on est infecté par le virus du SIDA, on peut faire un dépistage (inutile d'être à jeun).

Par prise de sang :

- ➔ Dès 6 semaines après un risque :
- Rapport sexuel non protégé.

- Le préservatif s'est déchiré.
- Partage de matériel d'injection ou de sniff.
- Lors d'un usage de drogues.

➔ Si l'on souhaite arrêter le préservatif.

➔ Et si l'on a pas eu de traitement d'urgence.

Par TROD (Test Rapide à Orientation Diagnostique = test par piqûre au bout d'un doigt avec un résultat rapide) qui peut être réalisé 3 mois après un risque.

Où ?

➔ Dans une Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuite du SIDA (CDAG) ou un Centre d'Information de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles (CIDDIST).

➔ Dans un laboratoire d'analyses médicales, remboursé avec une ordonnance.

Si vous avez pris un risque il y a moins de 48 heures, il faut vous rendre le plus tôt possible :

Au service des urgences ou au CDAG/CIDDIST - CIDDIST et CDAG du CHU Brabois, Bâtiment Philippe Canton - 03.83.15.41.28 - ligne 1 : arrêt Vandoeuvre CHU Brabois et ligne B arrêt B.S.M. Philippe Canton.

Pour en parler à tout moment :

SIDA INFO SERVICE : 0 800 840 800. Appel anonyme et gratuit 24h/24.
www.sida-info-service.org

Fil santé jeunes : 0 800 235 236. Appel anonyme de 8h à 24h.
www.filsantejeunes.com

Aides - 66 rue Stanislas - Nancy : 03.83.35.32.32

www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr

CIDDIST et CPEF - Maternité Régionale Universitaire de Nancy - 10 rue du Docteur Heydenreich : 03.83.34.43.18 - ligne 2 - arrêt Hôpital central-Maternité.

CIDDIST et CPEF - Centre de Santé MGEN - 6 rue Désilles - Nancy - 03.83.17.76.07 - ligne 9 - arrêt Désilles.